



# BENZOILSIRKAALDEGID GIDRAZONLARI ASOSIDA Ni(II) KOMPLEKS BIRIKMALARI TUZILISHINI IQ- SPEKTROSKOPIYA USULIDA TADQIQI

**Ibrohimova Mohigul Bahodir qizi**

*Buxoro Davlat Universiteti. 1-bosqich magistrnti*

**Tursunov Murod Amonovich**

*Buxoro Davlat Universiteti. Kimyo va neft-gaz texnologiyalari kafedrasini professori*  
[tursunovma@mail.ru](mailto:tursunovma@mail.ru)

**Annotatsiya:** benzoilsirka aldegid aroilgidrazonlarining ( $H_2L^1-H_2L^3$ ) spirtidagi eritmalar bilan Ni(II) –atsetat suv-ammiakli eritmasining o‘zaro ekvimolyar nisbatda ta’sirlashuvidan tekis-kvadrat tuzilishli  $NiL \cdot A$  ( $A=NH_3, Py$ ) kompleks birikmalar sintez qilindi. Ularning tuzilishi IQ spektroskopiyasi usulida tadqiq qilindi.

**Kalit so‘z:** benzoilsirka aldegid, aroilgidrazon, psevdoaromatik.

**Abstract:** Square-planar  $NiL \cdot A$  ( $A = NH_3, Py$ ) coordination compounds were synthesized by equimolar interaction of alcoholic solutions of benzoylacetic aldehyde aroylhydrazones ( $H_2L_1-H_2L_3$ ) with an aqueous-ammoniacal solution of nickel(II) acetate. The structures of the obtained complexes were investigated using infrared (IR) spectroscopy.


**Keywords:** benzoylacetic aldehyde, aroylhydrazone, pseudoaromatic.

**Аннотация:** Комплексные соединения  $NiL \cdot A$  ( $A = NH_3, Py$ ) с плоско-квадратной структурой были синтезированы в результате эквимольного взаимодействия спиртовых растворов арилгидразонов бензоилуксусного альдегида ( $H_2L_1-H_2L_3$ ) с водно-аммиачным раствором ацетата никеля(II). Строение полученных комплексов было исследовано методом инфракрасной (ИК) спектроскопии.

**Ключевые слова:** бензоилуксусный альдегид, арилгидразон, псевдоароматический.

$\beta$ -ketoaldegid aroilgidrazonlari eritmada gidrazon, yengidrazin va halqali pirazolin tautomer o‘tishlar kuzatiladi. Ni(II) bilan tridentat organik ligandlarning kompleks birikmalari sintezi, ularning metall ionlari ta’sirida tautomer shakllarini aniqlash orqali birmuncha qiziqarli ma’lumotlar olish uchun imkon beradi[1].

Ni(II)-atsetatlarning ammiakli suv eritmasi bilan ekvimolyar miqdordagi  $H_2L^1-H_2L^3$  ligandlarning spirtidagi eritmalarining o‘zaro ta’siridan  $NiL \cdot A$  ( $A=NH_3, Py$ ) (L-ikki karra deprotonlangan ligand qoldig‘i) tarkibli nikel(II) komplekslari sintez qilindi. Element analiz natijalari, birikmaning olingan IQ spektroskopiyasi parametrlariga muvofiq, yassi-kvadratlil poliedr tuzilishda yozishimiz mumkin[2]:



R=C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>, (NiL<sup>1</sup>·NH<sub>3</sub>), A=Py (NiL<sup>1</sup>·Py), *n*-CH<sub>3</sub>C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>, (NiL<sup>2</sup>·Py), *o*-OHC<sub>6</sub>H<sub>5</sub>, (NiL<sup>3</sup>·NH<sub>3</sub>).


Olingan Ni(II) kompleks birikmalarining reaksiya unumi va element tahlil natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Sintez qilingan kompleks birikmalarining reaksiya unumi va element analizi natijalari

| Birik-malar                       | U num, % | Brutto-formula  | Topilgan/Hisoblangan, % |                 |               |                 |
|-----------------------------------|----------|---|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                   |          |   | M                       | C               | H             | N               |
| NiL <sup>1</sup> ·NH <sub>3</sub> | 86       | NiC <sub>16</sub> H <sub>1</sub> <sub>5</sub> N <sub>3</sub> O <sub>2</sub> | 17,13/<br>17,27         | 56,42/<br>56,51 | 4,23<br>/4,45 | 12,75/<br>12,36 |
| NiL <sup>1</sup> ·Py              | 82       | NiC <sub>21</sub> H <sub>1</sub> <sub>7</sub> N <sub>3</sub> O <sub>2</sub> | 14,55/<br>14,60         | 62,43/<br>62,72 | 4,25<br>/4,26 | 10,63/<br>10,45 |
| NiL <sup>2</sup> ·Py              | 69       | NiC <sub>22</sub> H <sub>1</sub> <sub>9</sub> N <sub>3</sub> O <sub>2</sub> | 14,01/<br>14,10         | 63,28/<br>63,49 | 4,43<br>/4,60 | 10,47/<br>10,12 |
| NiL <sup>3</sup> ·NH <sub>3</sub> | 82       | NiC <sub>17</sub> H <sub>1</sub> <sub>7</sub> N <sub>3</sub> O <sub>4</sub> | 15,11/<br>15,20         | 52,76/<br>52,89 | 4,32<br>/4,44 | 11,00/<br>10,89 |

Ta'kidlash joizki, ammiakli kompleks birikmalar organik erituvchilarda yaxshi eriydi, lekin suvda erimaydi. Nikel(II) ning ammiakli kompleksi birikmalardan NiL<sup>1</sup>·NH<sub>3</sub> va NiL<sup>2</sup>·NH<sub>3</sub> minimal miqdordagi piridinda eritilganda NiL<sup>1</sup>·Py va NiL<sup>2</sup>·Py tarkibli kompleks birikmalar olindi[1-3].



1-rasm. NiL<sup>1</sup>·NH<sub>3</sub> kompleks birikmaning KBr tabletkasida presslab olingan IQ spektri.

Kompleks birikmalarining olingan IQ spektrlarida 3375-3380, 3320-3330, 3240-3250 va 3150 sm<sup>-1</sup> sohada yutilish chiziqlari kuzatilib, ular koordinatsion bog' orqali bog'langan ammiak molekulasi ning antisimmetrik valent tebranishlariga tegishli[1-2]. Komplekslarning

IQ spektrlarida erkin karbonil guruhga tegishli  $1640\text{ cm}^{-1}$  dan yuqori sohada yutilish chizig'i kuzatilmaydi. Barcha kompleks birikmalarning IQ spektrlarida  $1580\text{-}1585$ ,  $1530\text{-}1540$ ,  $1470\text{-}1480$ ,  $1420\text{-}1430$ ,  $1395\text{-}1400\text{ cm}^{-1}$  sohalarda o'rtacha va kuchli intensivlikdagi bir qator yutilish chiziqlari kuzatilib, ular besh va olti a'zoli metallohalqalar tutash sistemasining valent va deformatsion tebranishlariga mansub bo'ladi. S–O bog'ning valent tebranishlari chastotasi  $15\text{-}25\text{ cm}^{-1}$  ga kamayadi, bir vaqtning o'zida C=N bog'ning chastotasi  $5\text{-}10\text{ cm}^{-1}$  ga ortdi, u koordinatsion bog'lanish kislorod atomlari orqali sodir bo'lishini tasdiqlaydi [3].  $\text{NiL}^1\cdot\text{Py}$  va  $\text{NiL}^2\cdot\text{Py}$  komplekslarning spektrida kutilganidek, bu sohada yutilish chiziqlari kuzatilmaydi, lekin  $\nu_{(\text{C}=\text{O})}$  ga tegishli  $1600\text{ cm}^{-1}$  da chiziq paydo bo'ladi(1-rasm, 2-jadval).

2-jadval.

$\beta$ -ketoaldegid hosilalarini Ni(II) ion bilan hosil qilgan komplekslarining IQ spektrlaridagi asosiy tebranish chastotalari ( $\nu$ ,  $\text{cm}^{-1}$ )

| Birikmalar                | N<br>H <sub>3</sub> | P<br>y | C<br>-H | C<br>=N | C<br>-N | N<br>=C-O | N<br>-N | M-O |
|---------------------------|---------------------|--------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----|
| $\text{NiL}^1\text{NH}_3$ | 3347                | -      | 2950    | 1568    | 1276    | 1486      | 1075    | 470 |
| $\text{NiL}^1\text{Py}$   | -                   | 1600   | 2945    | 1600    | 1275    | 1487      | 1074    | 473 |
| $\text{NiL}^2\text{Py}$   | -                   | 1635   | 2930    | 1600    | 1274    | 1484      | 1070    | 474 |
| $\text{NiL}^3\text{NH}_3$ | 3350                | -      | 2940    | 1564    | 1274    | 1482      | 1069    | 476 |

IQ spektrlarni o'rganish natijalari olingan kompleks birikmalarning yassi-kvadrat tuzilishi to'g'risida xulosa chiqarishga imkon beradi [1-3].

### FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Умаров Б.Б., Турсунов М.А., Минин В.В. Комплексы с производными кетоальдегидов и кетоэфиров.- Ташкент.- Нишон-ношир.- 2016.- 350 с.
2. Tursunov M.A., Avezov K.G. and Umarov V.B. Nickel(II) and Zinc(II) Complexes with Benzoylacetaldеhyde Derivatives. Russian Journal of Coordination Chemistry. 2019, V. 45, N. 7, P. 484-488.
3. Турсунов М.А., Умаров Б.Б., Эргашов М.Я., Аvezов К.Г. Синтез и кристаллическая структура комплекса никеля(II) с ароилгидразоном этилового эфира 5,5-диметил-2,4-диоксогексановой кислоты // ЖСХ.-2020.-Т.61.-№1.-С. 78-90.
4. Турсунов М.А. Комплексы некоторых 3d-металлов на основе производных кетоальдегидов и кетоэфиров; их строение и свойства : Дис. ... канд.хим.наук.- Т.: БГУ.- 2019.- 120 с.
5. Умаров Б.Б., Ларин Г.М., Якимович С.И., Минин В.В., Парпиев Н.А. Синтез и спектры комплексов меди(II) на основе ароилгидразонв формилпинаколина и метилового эфира 5,5-диметил-2,4-диоксогексановой кислоты // Узб. хим. журн.- 1993.- № 3.- С. 12-14.

6. Ramazonov S.H., Tursunov M.A., Xudoyberganov O.I. Degidroasetik kislotasi atsetil gidrazonining sintezi, tuzilishi va xossalari. Development of science 2025 / 10 issue 10. volume 5. p 170-175.

7. Турсунов М.А., Умаров Б.Б., Якимович С.И., Севинчов Н.Г., Зерова И.В., Абдурахмонов С.Ф., Парпиев Н.А. Синтез и исследование *пара*-замещенных бензоилгидразонов этилового эфира 2,4-диоксопентановой кислоты // Современные технологии и инновации горно–металлургической отрасли.- НавГГИ, Навои. 14-15 июня. 2012.- С. 349-350.

8. Турсунов М.А., Умаров Б.Б., Авезов К.Г., Якимович С.И., Абдурахманов С.Ф., Севинчов Н.Г., Парпиев Н.А. Синтез и стереоизомерия ацилгидразонов кетозэфиров // Наука и технологии. Т.1. Тр. Международного симпозиума по фундаментальным и прикладным проблемам науки”. Глава 8.- М.: РАН.- 2012.- С. 158-178.

9. Турсунов М.А., Умаров Б.Б. Синтез и кристаллическая структура комплекса никеля(II) на основе бензоилгидразона метилового эфира 4-фенил-2,4-диоксобутановой кислоты // Universum: химия и биология: электрон. научн. журн.- 2018.- №12(54).- С. 50-53.

10. Турсунов М.А., Умаров Б.Б., Бахронова Д.А. Темплатный синтез комплекса никеля(II) на основе бензоилгидразона метилового эфира 4-фенил-2,4-диоксобутановой кислоты // Международная конференция “Современные инновации: Химия и химическая технология ацетиленовых соединений. Нефтехимия. Катализ” Посвящается 100-летию Национального университета Узбекистана и 80-летию со дня рождения профессора Т.С. Сирлибаева.- 14-17 ноября. 2018.- Ташкент.- С. 305-306.

10. Nigina Qahramon Qizi Savriyeva, Murod Amonovich Tursunov, Bakhtiyor Shukrulloevich Ganiev. Novel [5-Hydroxy-3-phenyl-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl](phenyl)methanone: Synthesis, Characterization and Computational Analysis. Advanced Journal of Chemistry, Section A, 2026, 9(2), 192-207.

12. Ramazonov S.H., Tursunov M.A., Xudoyberganov O.I. Degidroasetik kislotasi atsetil gidrazonining sintezi, tuzilishi va xossalari. Development of science 2025 / 10 issue 10. volume 5. p 170-175.

13. Husenov Q.Sh., Tursunov M.A., Xudoyarova E.A., Ithomov A.A. 4-fenil-2,4-dioksobutan kislota metil efiri aroilgidrazoni asosida Ni(II) va Cu(II) ionlarining kompleks birikmalar sintezi, tuzilishi va xossalari. International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences Vol.3(6), 2025, IF=4.372, ICV 59.69. P. 31-39.

14. Tursunov M.A., Umarov B.B., Tulisova N.Z. 2,4-dioksoptan kislota etil efirining aroilgidrazonlarining Cu(II) ioni bilan kompleks birikmalari. Development of science 2025 / oktyabr/10. volume 3. p 95-102.

15. Amonov M.M., Tursunov M.A., Boboqulova O.V. 4,4-diftor-1-fenil-1,3-butandion benzoilgidrazoni sintezi, tuzilishi va xossalari. Development of science 2025 / oktyabr/10. volume 3. p 208-214.